

CAMPOFORT®

K 400



Płynny nawóz mineralny z makroelementami KFV1(C) (I)(b)(i): K, 24,9

30,0 % (v/v) K ₂ O (= 24,9 % (v/v) K	rozp. w wodzie potas	400 g/l
---	----------------------	---------

Składniki: Octan potasu, CAS:127-08-02¹
¹oryginalne materiały i mieszanki

Zalecenia stosowania: Stosować jako oprysk dolistny, odżywianie pozakorzeniowe. Należy unikać nadmiernego nawożenia i przestrzegać oficjalnych wytycznych przy ustalaniu harmonogramów nawożenia.

Objętość opakowania: 13,5 kg • 27 kg • 675 kg • 1350 kg (tj. 10 litrów • 20 litrów • 500 litrów • 1000 litrów). **ROZTWÓR**

Producent: AGRA GROUP a.s., Tovární 201, 387 15 Střelské Hoštice, Republika Czeska.

Warunki przechowywania: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze od -5°C do +30°C w chłodnym i przewiewnym miejscu.

Maksymalna liczba warstw podczas magazynowania: Kanistry 21 dm³: 3 warstwy - Pojemnik 1 m³: 2 warstwy.

Okres przydatności: 18 miesięcy od daty produkcji nawozu, pod warunkiem przestrzegania warunków przechowywania.

Zakres i sposób stosowania: Listové hnojivo CAMPOFORT® K 400 jest przeznaczony do szybkiego uzupełniania niedoborów potasu poprzez opryskiwanie liści roślin w intensywnie rosnących uprawach o dużym zapotrzebowaniu na potas lub w przypadku ograniczonego pobierania potasu przez korzenie z gleby (niska zawartość w glebie, nieodpowiednie pH, przesuszone lub podmokłe gleby itp.).

Zasady wykonywania oprysku:

1. Nie przekraczać zalecanego stężenia roztworu.
2. Nie opryskiwać roślin przy ostrym słońcu i wysokich temperaturach; najlepiej wykonywać oprysk rano (po ustąpieniu rosy) lub późnym popołudniem. Stosowanie nawozu przed wystąpieniem opadów lub w czasie deszczu nie przyniesie oczekiwanych efektów.
3. Nie aplikować w uprawach o niewystarczającej powierzchni aktywnych liści.
4. Przygotowaną ciecz roboczą ciągle mieszając aplikować aż do całkowitego wykorzystania.

W przypadku łączenia z innymi nawozami i środkami ochrony roślin zawsze zalecamy wykonanie testu mieszalności. Nawóz należy dodawać jako ostatni składnik. **Nigdy nie należy tworzyć mieszanki zbiornikowej ze skoncentrowanych produktów!**

Zalecenia dotyczące aplikacji:

Roślina uprawna	Termin aplikacji	Dawka	Ilość wody
Zboża, oleiste, strączkowe	W zależności od potrzeb na liście roślin	1 do 4 l/ha	120–300 l/ha
Okopowe	W zależności od potrzeb na liście roślin	1 do 4 l/ha	150–300 l/ha
Winorośl	W zależności od potrzeb na liście roślin	1 do 4 l/ha	300–1000 l/ha
Owocowe	W zależności od potrzeb na liście roślin	1 do 5 l/ha	300–1000 l/ha
Chmiel	W zależności od potrzeb na liście roślin	1 do 6 l/ha	500–2000 l/ha
Warzywa	W zależności od potrzeb na liście roślin	1 do 2,5 l/ha	300–1000 l/ha

Zawartość zanieczyszczeń w nawozie nie przekracza ustalonych wartości granicznych.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska:

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008: produkt CAMPOFORT® K 400 nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny ani nie stanowi zagrożenia dla zdrowia (patrz karta charakterystyki).

Likwidacja opakowania i pozostałości nawozu:

Puste opakowania należy oddać do punktu zbiórki surowców wtórnych lub spalić w akredytowanej spalarni. Wodę z płukania opryskiwacza należy użyć ponownie do oprysku. Produkt oraz jego pozostałości, a także woda użyta do płukania opryskiwacza, nie mogą być wprowadzane do źródeł wód gruntowych ani do odbiorników wód powierzchniowych.

DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO.



AGRA serwis: www.agra.cz, tel.: +420 383 399 737

Data produkcji/numer partii: