

StabilureN® 30

wspomagający preparat doglebowy z inhibitorem ureazy

Producent i dostawca: AGRA GROUP a.s., Tovární 201, Střelské Hoštice, Česká republika

Numer rejestracji: 4757

Opakowania: 10 l

Właściwości fizykochemiczne

Parametr	Wartość
zawartość NBPT %	min. 30

*NBPT: inhibitor ureazy; triamid N-(n-butyl) tiofosforanowy

Produkt wprowadzony do obrotu na podstawie art. 5 ustawy z dnia 10 lipca 2007 roku o nawozach i nawożeniu.

Zawartość rozpuszczalników organicznych: monometyloeter glikolu dwupropylenowego z dodatkami substancji obojętnych: 69 %. **Zawartość substancji niebezpiecznych:** Spełnia obowiązujące normy zawartości (w mg/kg wspomagającego preparatu doglebowego) kadm 1, ołów 10, rtęć 1,0, arsen 20, chrom 50. **StabilureN® 30** jest wspomagającym preparatem doglebowym, który hamuje aktywność enzymu ureazy, poprzez co spowalnia rozkład azotu amidowego do amoniaku. Stosuje się go jako dodatek do nawozów płynnych, które zawierają azot w formie amidowej. Produkt **StabilureN® 30** po dodaniu do wyżej wymienionych nawozów ogranicza straty azotu wynikające z ułatniania się amoniaku i polepsza wykorzystanie azotu z użytych nawozów.

Zakres i sposób stosowania: **StabilureN® 30** jest przeznaczony przede wszystkim do stosowania wraz ze skoncentrowanymi nawozami płynnymi typu RSM czy RSMS, ewentualnie z roztworami mocznika. Mieszanina z nawozami typu RSM czy RSMS może być bez zmniejszenia skuteczności produktu użyta do 7 dni od przygotowania mieszaniny. W przypadku zawartości fosforu w skoncentrowanym nawozie płynnym należy mieszaninę zużyć do 1 dnia. W przypadku nawozów stałych (np. mocznik) przed użyciem, na powierzchnię granuli w specjalnym urządzeniu mieszającym nanosi się odpowiednią ilość produktu. **StabilureN® 30** nie może być używany z nawozami, które zawierają mniej niż ½ z całkowitego azotu w formie amidowej.

Zalecane dawkowanie

Nawóz	StabilureN® 30 – dawkowanie
Mocznik	1,4 do 2,5 l/t
Roztwory mocznika	1,4 do 2,5 ml/1 kg rozpuszczonego mocznika
RSM 390	0,8 do 1,24 l/1 m ³
i inne	0,7 do 0,9 l/1 m ³



Niższe dawki produktu są zalecane przy stosowaniu nawozów przy niższych temperaturach gleby i przy miejscowych aplikacjach nawozów (np. nawożenie przedsiwne itp.), wyższe dawki są stosowane przy wyższych temperaturach gleby i przy wysokiej aktywności biologicznej gleby (np. dużo pozostałości pożywnych, aplikacja nawozów organicznych). Nawozy z dodatku produktu **StabilureN®** stosuje się identycznie jak nawozy bez jego dodatku.

StabilureN® 30 zawiera inhibitor ureazy triamid N-(n-butyl) tiofosforanowy i rozpuszczalnik monometyloeter glikolu dwupropylenowego.

H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. **H361:** Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.

Instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy:

P201: Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. **P202:** Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa. **P280:** Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. **P281:** Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. **P305+P351+P338** **W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:** Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. **P308+P313:** W PRZYPADKU NARAŻENIA LUB STYCZNOŚCI: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. **P310:** Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCI lub lekarzem. **P401:** Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w temperaturze nieprzekraczającej 30 °C. **P501:** Pojemnik usunąć w miejscu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych, zgodnie z narodowymi, miejscowymi przepisami.

Warunki przechowywania:

P401 + P411: Przechowywać w oryginalnych opakowaniach. Przechowywać w temperaturze nie przekraczającej 30 °C. **P403 + P404:** Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w zamkniętym pojemniku.

Zalecana temperatura przechowywania: od -15 °C do +30 °C. Jeśli w wyniku niższej temperatury magazynowania wytrącają się w roztworze kryształy to rozpuszczą się one w momencie osiągnięcia przez roztwór normalnej temperatury. Nie obniża to skuteczności działania produktu. Nie zaleca się jednakże składowania w podwyższonych temperaturach, gdyż może dojść do obniżenia skuteczności działania. Zalecane temperatury magazynowania (przebież wszystkim górna granica) dotyczą też nawozów, do których dodano już produkt **StabilureN® 30**.

Okres przydatności: 18 miesięcy od daty produkcji przy dotrzymaniu warunków przechowywania. Zabrania się długookresowego wystawiania kanistrów na działanie światła słonecznego, gdyż promienie UV pogarszają właściwości fizyczne plastiku.

Likwidacja opakowań i pozostałości produktu: Puste opakowania PE oddać do recyklingu lub punktu selektywnej zbiórki odpadów lub spalić w akredytowanej spalarni odpadów. Wodę z płukania kanistrów użyć do przygotowania cieczy aplikacyjnej. Odkazanie: Odkazanie opryskiwacza, środki ochrony osobistej i inne urządzenia pomocnicze odkazać 3% roztworem węgla sodu. **Wspomagający preparat doglebowy dostarczany jest pakowany.**



Uwaga

AGRA serwis: www.agra.cz, tel.: +420 383 399 737

Data produkcji / numer partii: